

**INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS:**

**PROTOCOLOS A SEGUIR CUANDO EXISTEN ENFERMEDADES EN LOS ALUMNOS/AS:**

PROCESO	PERMANENCIA EN CASA	COMENTARIOS	SUGERENCIA
<b>FIEBRE</b>	Hasta 48 horas después de la última fiebre.	Es considerada fiebre cuando lleguen a los 38º	Avisar al centro siempre que este inestable.
<b>GASTROENTERITIS (diarrea y/o vómito)</b>	Hasta 48 horas después de la última diarrea o vómito En casos especiales (como Salmonella, Shigella o E. coli) se necesitará análisis de control de las heces. Reservando en casa.	Pueden ser producidas por virus, bacterias o protozoos (giardias)	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>GRIPE,CATARRO</b>	No, si está sin fiebre y sin dificultad respiratoria	El niño no debe acudir si tiene fiebre, dolor de oído, dificultad respiratoria o malestar, que indican complicación o gravedad	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>BOCA PIE MANO</b>	Es muy contagioso por lo que se recomienda, permanezcan atentos y mantener en casa. Duracion de 1 ó 2 semanas.	El síndrome mano-pie-boca es una estomatitis a la que se suman lesiones en manos y pies. Puede comenzar con fiebre.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>CONJUNTIVITIS</b>	Hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento	Es frecuente que acompañen a los catarros	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>LOMBRICES</b>	NO	Hay que tratarlas toda la familia aunque tenga uso del pañal.	Avisar al centro para mantener un cuidado en los cambios con pañal.
<b>VARICELA</b>	Hasta siete días después de iniciada la erupción o hasta que todas las lesiones estén en forma de costra ( dos semanas aprox)	La posibilidad de contagio se prolonga <b>desde dos días antes de la aparición del exantema hasta la formación de las costras</b> . El niño no puede regresar al colegio hasta transcurridos siete días desde la aparición del exantema sobre la piel.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>SARAMPION,RUBEOLA, PAROTIDITIS (paperas)</b>	Hasta cinco días después del comienzo del exantema o de iniciada la inflamación de la parótida, en el caso de las paperas	Suelen ser enfermedades raras porque los niños se vacunan a los 12 meses y a los 3 años	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>ERITEMA INFECCIOSO (VIRUS DE LA BOFETA) QUINTA ENFERMEDAD</b>	Sí, es una enfermedad contagiosa, si bien cuando aparece la erupción ya ha dejado de serlo y, por tanto, no es necesario el aislamiento del niño en su casa y puede asistir a la escuela o guardería.	Se transmite por vía respiratoria por medio de secreciones nasales y saliva aunque existen otras formas de contagio como la sangre aunque este medio es mucho más raro. se caracteriza inicialmente porque produce <u>fiebre</u> , síntomas catarrales leves, malestar general y dolor de músculos y articulaciones. Al cabo de	Suele confundirse con dermatitis por lo que se recomienda enlazar otras dolencias con esta. Avisar al centro para llevar un control de alumnos

		pocos días, a estos síntomas <b>se une la aparición de una erupción de color rojo intenso en la piel</b> que comienza en las mejillas y produce en el niño el aspecto de haber recibido una bofetada	
<b>EXANTEMA SUBITO</b>	No, excepto en la duración de la fiebre.	Fiebre elevada durante 3 días sin ningún otro síntoma. Al cuarto día, cede la fiebre de forma brusca y aparece un exantema (erupción) en la piel del tronco, cuello y espalda con unas manchitas sonrosadas pequeñas	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>IMPETIGO</b>	Hasta que aparecen las costras.	El impétigo es contagioso. Puede contagiar a cualquier persona que entre en contacto con piel u otros elementos infectados (como prendas de vestir, toallas y sábanas) que hayan estado en contacto con piel infectada.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>VERRUGAS, MOLUSCOS</b>	NO	Evitar que compartan toallas u otros utensilios con otros niños En niños pequeños es muy difícil que no existan contacto. Por lo que mantener la zona lo mejor cuidada posible.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>PEDICULOSIS (PIOJOS)</b>	Hasta la eliminación de piojos y liendres	No es una enfermedad.	Informar a la Escuela para llevar un control de alumnos.
<b>MICOSIS</b>	Hasta que el pediatra considere que no son contagiosas.	Enfermedad infecciosa producida por hongos microscópicos que puede afectar a cualquier parte del organismo	Se transmite de animales a personas, pero generalmente no entre personas Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>AMIGDALITIS / FARINGITIS / INFECCIONES RESPIRATORIAS</b>	Un niño con sospecha de enfermedad infecciosa bacteriana de vías respiratorias (adenoiditis, faringitis, amigdalitis, sinusitis, otitis media, traqueobronquitis, neumonía) debería ser excluido de la guardería un mínimo de 48 horas hasta después de iniciado el tratamiento antibiótico.	Dependiendo de la dolencia, tendrá un tratamiento u otro. El pediatra es el especialista que podrá orientar a las familias	Avisar al centro para llevar un control de alumnos

<b>ESCARLATINA</b>	Hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico	La enfermedad se produce por una faringoamigdalitis aguda (anginas) asociada a un exantema, que es la característica erupción en la piel, de color escarlata	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>MUGUET</b>	No es necesaria. Pero se aconseja que hasta que desaparezcan las pintas blancas, es muy contagioso en niños con las defensas bajas.	Es una infección muy común provocada por un hongo llamado "cándida albicans" (por eso, también se la llama candidiasis oral) que se manifiesta en forma de manchas blancas en el interior de las mejillas, el paladar, la lengua y los labios.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>TUBERCULOSIS</b>	Hasta dos semanas una vez iniciado el tratamiento.	No suele ser una infección habitual Requiere estudio de los contactos	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>TOSFERINA</b>	Hasta 5 días después de iniciado el tratamiento	Poco frecuente porque los niños están vacunados	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>HEPATITIS A, B Y C</b>	Hasta 7 días después de que el niño se pone amarillo	H.A. Vía de transmisión feco-oral	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>HEPATITIS B Y C</b>	NO	Evitar el contacto con sangre de persona infectada La vacuna de la hepatitis B está incluida en el calendario vacunal infantil	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>MENINGITIS MONUCLEOSIS</b>	Hasta la total recuperación del niño.	Según el tipo de germen, las autoridades sanitarias darán las medidas oportunas para los contactos (profilaxis o diagnóstico precoz)	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>VIH</b>	NO	No existe contagio, por el roce, estornudar... solo a través de la sangre directa.	Avisar al centro para llevar un control de alumnos
<b>COVID-19</b>	<b>Muy contagioso.</b> Puede presentarse a través de: fiebre, tos, dolor de garganta, respiración rápida, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto y del olor, dolor abdominal, vómitos o diarrea, erupción en la piel labios rojos, secos y agrietados, ojos rojos, hinchazón de manos o pies, dolor en las articulaciones, mareos, problemas en la vista, dolor de cabeza, palidez.		Avisar en todo momento al centro en caso de sospecha. En el centro mantendremos el protocolo de prevención.